

Mon enfant de 6-17 ans a un ou au moins deux symptôme(s) de la COVID-19*

- **Fièvre**
- **Toux nouvelle ou aggravée**
- **Mal de gorge**
- **Perte soudaine du goût ou de l'odorat**
- **Essoufflement, difficulté à respirer**
- Grande fatigue
- Mal de tête
- Perte d'appétit importante
- Douleurs musculaires non liées à un effort
- Nausées, vomissements, diarrhées, maux de ventre
- Nez qui coule ou congestion nasale



Si les symptômes débutent à la maison, mon enfant reste à la maison et j'avise l'école de son absence.

Si les symptômes débutent à l'école, on m'avise et je dois aller chercher mon enfant.

Tous les autres membres de ma famille doivent aussi s'isoler à la maison*.



Consignes pour les contacts domiciliaires*

Moins de 12 ans

- Isolement de 5 jours à partir du début des symptômes de la première personne de la maisonnée.
- Faire un test rapide au jour 5. Si le résultat est négatif, fin de l'isolement. S'il est positif ou si vous n'avez pas accès à un test, poursuite de l'isolement pour 5 jours.

Plus de 12 ans doublement vaccinés

- Isolement de 5 jours à partir du début des symptômes de la première personne de la maisonnée.
- Port du masque en tout temps et distanciation de 2 mètres (si possible) pour 5 jours supplémentaires

Plus de 12 ans non doublement vaccinés

- Isolement de 10 jours à partir du début des symptômes de la première personne de la maisonnée.

*Une exemption d'isolement s'applique pour les personnes ayant eu la COVID-19 depuis le 20 décembre 2021. Les détails de l'application de cette exemption se trouvent en page 2 de ce document.

Levée de l'isolement de mon enfant et de toute la famille si :

- Amélioration des symptômes
- Absence de fièvre depuis 24 heures, sans médication

Résultat



Je fais passer un test rapide à mon enfant immédiatement

OUI

J'ai accès à un test rapide

NON



J'attends 24 heures et je lui fais passer un deuxième test rapide

Résultat



Résultat



Si les contacts domiciliaires développent des symptômes ou obtiennent un résultat de dépistage positif pendant leur isolement


⊕ Votre enfant ou la personne est considéré(e) comme un cas positif de COVID-19 et doit suivre les consignes suivantes selon son âge et son statut vaccinal :

Enfant de moins de 12 ans	Personne de 12 ans et plus doublement vaccinée	Personne de 12 ans et plus qui n'est pas doublement vaccinée
<ul style="list-style-type: none"> • Isolement de 5 jours à partir du début de ses symptômes (le jour du début des symptômes est le jour 0) • Levée de son isolement si : <ul style="list-style-type: none"> ○ Amélioration des symptômes ○ Absence de fièvre depuis 24 heures, sans médication ○ Test rapide négatif au jour 5 de l'isolement 🧪 • Port du masque (si applicable) en tout temps et distanciation de 2 mètres (si possible) pour 5 jours supplémentaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolement de 5 jours à partir du début de ses symptômes (le jour du début des symptômes est le jour 0) • Levée de son isolement si : <ul style="list-style-type: none"> ○ Amélioration des symptômes ○ Absence de fièvre depuis 24 heures, sans médication <i>Si ces 2 critères ne sont pas respectés, poursuite de l'isolement pour 5 jours</i> • Port du masque en tout temps et distanciation de 2 mètres (si possible) pour 5 jours supplémentaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolement de 10 jours à partir du début de ses symptômes (le jour du début des symptômes est le jour 0) • Levée de son isolement si : <ul style="list-style-type: none"> ○ Amélioration des symptômes ○ Absence de fièvre depuis 24 heures, sans médication <i>Si ces 2 critères ne sont pas respectés, poursuite de l'isolement jusqu'à ce qu'ils le soient</i>



Si un de ces trois critères n'est pas respecté (ou si je n'ai pas accès à un test rapide), l'isolement doit être prolongé de 5 jours. Il est possible de lever l'isolement entre le jour 6 et le jour 10, si mon enfant obtient 2 tests rapides négatifs à 36 heures d'intervalle et que les deux autres critères sont respectés.

*La personne a déjà eu la COVID-19. Doit-elle s'isoler?



**Contact à risque élevé : personne qui vit sous le même toit qu'un cas (contact domiciliaire), partenaire sexuel ou couple qui ne partage pas le même domicile.